








Outil de contrôle des selles

SEMAINE _____

| matin | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven | Sam | Dim. |
|----------------------|------|------|------|------|-----|-----|------|
| Assis sur la cuvette | | | | | | | |
| Selles | | | | | | | |
| Code accident | | | | | | | |
| Timing accident | | | | | | | |
| Laxatif osmotique | | | | | | | |
| Laxatif stimulant | | | | | | | |
| Thérapie rectale | | | | | | | |
| Après-midi | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven | Sam | Dim. |
| Assis sur la cuvette | | | | | | | |
| Selles | | | | | | | |
| Code accident | | | | | | | |
| Timing accident | | | | | | | |
| Laxatif osmotique | | | | | | | |
| Laxatif stimulant | | | | | | | |
| Thérapie rectale | | | | | | | |

Bristol Stool Chart

| | | |
|--------|---|--|
| Type 1 |  | Separate hard lumps, like nuts (hard to pass) |
| Type 2 |  | Sausage-shaped but lumpy |
| Type 3 |  | Like a sausage but with cracks on the surface |
| Type 4 |  | Like a sausage or snake, smooth and soft |
| Type 5 |  | Soft blobs with clear-cut edges |
| Type 6 |  | Fluffy pieces with ragged edges, a mushy stool |
| Type 7 |  | Watery, no solid pieces. Entirely Liquid |

Mode d'emploi :

Cochez la case lorsque l'enfant est assis sur la cuvette (matin = à tout moment avant midi. Après-midi = à tout moment après midi) Indiquez lorsque l'enfant va à la selle en utilisant les numéros de 1 à 7 indiquant la consistance des selles selon le tableau Bristol des selles. Indiquez tout accident éventuel en utilisant les codes suivants : S = strie ou souillure, ou un des numéros correspondants (1-7) indiqués sur le tableau Bristol selon la consistance des selles.

Donnez une description brève du timing de l'accident (par exemple, en jouant, dans la voiture, à l'école, etc.). Indiquez les médicaments utilisés (le cas échéant) :

Laxatif osmotique: polyéthylène glycol (PEG 3350) mesuré en cuillères à café ou capuchons, lactulose en millilitres ou cuillères à café, laxatif à base d'huile minérale ou de magnésium en millilitres ou cuillères à café

Laxatif stimulant : Le séné mesuré en cuillères à café ou des comprimés, du Bisacodyl mesuré en comprimés

Thérapie rectale: S= suppositoire, L= lavement

<http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/kids-chore-schedule.html>

→ **Locate a Pediatric Gastroenterologist**

IMPORTANT REMINDER: This information from the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN) is intended only to provide general information and not as a definitive basis for diagnosis or treatment in any particular case. It is very important that you consult your doctor about your specific condition.



714 N Bethlehem Pike, Suite 300, Ambler, PA 19002 Phone: 215-641-9800 Fax: 215-641-1995 naspghan.org



Educational support was provided by
The Allergan Foundation